

Cáncer vaginal

El cáncer vaginal es un tipo de cáncer ginecológico poco frecuente que se desarrolla cuando aparecen células malignas en los tejidos de la vagina. Debido a que en sus primeras etapas puede no causar síntomas evidentes, muchas mujeres desconocen su presencia hasta que se detecta durante una revisión ginecológica. Aunque representa un porcentaje reducido de los cánceres del aparato reproductor femenino, conocer sus señales de alerta, factores de riesgo y métodos de prevención puede marcar una gran diferencia en el diagnóstico temprano y en las posibilidades de tratamiento exitoso.

¿Qué es el cáncer vaginal?

El **cáncer vaginal** es una enfermedad que ocurre cuando las células de la vagina comienzan a crecer de forma descontrolada y forman un tumor maligno.

Se considera uno de los **cánceres ginecológicos menos frecuentes**, pero puede afectar a mujeres de diferentes edades. En algunos casos se desarrolla como consecuencia de alteraciones celulares relacionadas con el **Virus del Papiloma Humano (VPH)**, aunque también puede aparecer por otras causas. La detección temprana es fundamental, ya que aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Tipos de cáncer vaginal

Existen varios tipos de cáncer vaginal dependiendo de las células donde se origine el tumor.

- **Carcinoma de células escamosas:** Es el tipo más común y representa la mayoría de los casos diagnosticados. Se desarrolla en las células que recubren la superficie interna de la vagina y suele crecer lentamente a partir de lesiones precancerosas conocidas como neoplasia intraepitelial vaginal.
- **Adenocarcinoma:** Se origina en las células glandulares de la vagina. Es menos frecuente y puede presentarse en mujeres jóvenes o adultas.
- **Melanoma vaginal:** Es una forma poco común de cáncer que se desarrolla en las células encargadas de producir pigmento. Generalmente aparece en la parte inferior o externa de la vagina.
- **Sarcoma vaginal:** Se forma en tejidos profundos como músculos, tejido conectivo o vasos sanguíneos de la pared vaginal. Dentro de este grupo destacan el rhabdomyosarcoma y el leiomyosarcoma.

Síntomas del cáncer vaginal

En etapas iniciales el cáncer vaginal puede no presentar síntomas. Sin embargo, conforme la enfermedad progresa pueden aparecer señales que requieren atención médica.

Los síntomas más frecuentes incluyen sangrado vaginal fuera del periodo menstrual, sangrado después de las **relaciones sexuales**, flujo vaginal anormal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor pélvico persistente, sensación de presión en la pelvis, presencia de un bulto dentro de la vagina, dolor al orinar, necesidad frecuente de acudir al baño y estreñimiento sin una causa aparente.

Ante cualquiera de estos síntomas es recomendable acudir con un ginecólogo para realizar una valoración completa y descartar cualquier alteración.

Estadios del cáncer vaginal

La clasificación por estadios permite conocer el grado de avance de la enfermedad y planificar el tratamiento más adecuado.

- **Estadio I:** El cáncer se encuentra únicamente en la pared vaginal y no se ha extendido a otras estructuras.
- **Estadio II:** El tumor se ha propagado a tejidos cercanos alrededor de la vagina, pero aún permanece dentro de la pelvis.
- **Estadio III:** La enfermedad se ha extendido a otras zonas de la pelvis o a ganglios linfáticos cercanos.
- **Estadio IVA:** El cáncer ha invadido órganos próximos como la vejiga o el recto.
- **Estadio IVB:** Las células cancerosas se han propagado a órganos distantes como pulmones, hígado o huesos.

Diagnóstico del cáncer vaginal

- El diagnóstico del cáncer vaginal comienza con una evaluación médica completa y una **exploración ginecológica** detallada. Muchas veces las primeras sospechas aparecen durante una revisión rutinaria.
- Las pruebas más utilizadas incluyen el **Papanicolaou**, la prueba de VPH, la **colposcopia** y la biopsia vaginal, que permite confirmar la presencia de células cancerosas. También pueden solicitarse estudios de imagen como **ultrasonido**, tomografía computarizada, resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones para determinar el tamaño del tumor y su posible extensión.

Un **diagnóstico temprano del cáncer vaginal** permite iniciar el tratamiento en etapas más tempranas y mejorar considerablemente el pronóstico.

Tratamiento del cáncer vaginal

El tratamiento depende del tipo de cáncer, el estadio en el que se encuentre y las características particulares de cada paciente.

- La cirugía puede utilizarse para extirpar lesiones precancerosas o tumores localizados. La radioterapia emplea radiación para destruir las células cancerosas y es uno de los tratamientos más utilizados en este tipo de cáncer. La quimioterapia utiliza medicamentos especializados para eliminar o reducir el crecimiento de las células malignas.
- En algunos casos se combinan varios tratamientos para obtener mejores resultados. El equipo médico determinará la estrategia más adecuada de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Factores de riesgo del cáncer vaginal

Existen diversos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer vaginal.

- La infección persistente por el Virus del Papiloma Humano es uno de los principales factores asociados a esta enfermedad. También influyen antecedentes de lesiones precancerosas cervicales o vaginales, tabaquismo, sistema inmunológico debilitado, antecedentes de cáncer cervicouterino, edad avanzada y exposición a ciertos medicamentos durante el desarrollo fetal.
- Tener uno o varios factores de riesgo no significa necesariamente que se desarrollará la enfermedad, pero sí hace recomendable mantener controles ginecológicos regulares.

Prevención del cáncer vaginal

Aunque no todos los casos pueden prevenirse, existen medidas que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar cáncer vaginal.

- La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es una de las estrategias más efectivas para disminuir la aparición de lesiones relacionadas con este virus.
- También es importante mantener relaciones sexuales protegidas, evitar el tabaquismo y acudir periódicamente al ginecólogo para realizar estudios preventivos.
- Las revisiones ginecológicas permiten detectar alteraciones celulares antes de que evolucionen a enfermedades más graves, facilitando un tratamiento oportuno y menos invasivo.

Preguntas frecuentes sobre el cáncer vaginal

¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer vaginal?

Los síntomas iniciales pueden incluir sangrado vaginal fuera del periodo menstrual, flujo anormal, molestias pélvicas y dolor durante las relaciones sexuales.

¿El cáncer vaginal está relacionado con el VPH?

Sí. Muchos casos están asociados a una infección persistente por determinados tipos de Virus del Papiloma Humano, especialmente los considerados de alto riesgo.

¿Cómo se detecta el cáncer vaginal?

Se diagnostica mediante exploración ginecológica, Papanicolaou, colposcopia, biopsia y estudios de imagen cuando son necesarios.

Autor y colaboradores



Eva Sánchez Castro
Comunicadora Social, Autor

Comunicadora social y especialista en contenido de calidad para webs médicas con más de 10 años de experiencia. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 4 Agosto 2017 Actualización: 13 Julio 2026



Delia Sánchez Castro
Colaborador

Comunicadora social y periodista con más de 20 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 4 Agosto 2017 Actualización: 13 Julio 2026